

## **ASTSIIDI PUNKTSIOON**

### **Uuringumeetod**

Astsiidi punktsioon on protseduur, mille eesmärgiks on eemaldada kõhuõõnest sinna kogunenud vedelikku. Astsiidi punktsiooni tehakse kas ravi või uuringu eesmärgil.

### **Näidustused**

Protseduur on vajalik selleks, et uurida, mis põhjusel on kõhuõõnde kogunenud liigselt vedelikku. See võib osutada oluliseks juhul, kui diagnoosi ei õnnestu teiste meetoditega täpsustada (näiteks tuberkuloosi, kasvajate, põletiku korral).

Teiseks näidustuseks on astsiidi punktsioon ravi eesmärgil. Kui kõhuõõnde kogunenud liigset vedelikku ei õnnestu ravimitega eemaldada ning teil on tekkinud hingeldus, on vajalik kõhuõõnt punkteerida.

### **Uuringuks ettevalmistus**

Informeerige kindlasti oma raviarsti kui tarvitate aspiriini ja aspiriinitaoliseid ravimeid või nn. verevedeldajaid (näiteks varfariin).

Samuti informeerige arsti kui Teil on allergia ravimitele (näiteks lidokaiin).

### **Uuringu teostamine**

Enne protseduuri tuleb teil tualettruumis tühjendada põis.

Edasi istute te toolile ning arst valib välja parima punktsiooni koha. Tavaliselt asub see kõhu keskjoonel nabast allpool, kuid võib olla vajalik ka muu punktsiooni koht. Arst puhastab punktsiooni koha, seejärel tuimestatakse punktsiooni kohal nahk ja selle aluskoed. Seejärel viib arst kõhuõõnde jämeda punktsiooninõela või kanüüli ja eemaldab kõhuõõnest vajaliku koguse astsiidivedelikku. Peale punktsiooni asetatakse punktsioonikohale side ning Te peate mõne aja lamama.

### **Võimalikud tüsistused ja ohud**

Üldiselt on protseduur ohutu ja tüsistusi esineb harva.

Kõige tõsisemaks ohuks on vigastada nõelaga kõhuõõne organeid (näiteks soolt, maksa, põrna).

Liiga kiiresti suure vedelikukoguse eemaldamisel võib tekkida vererõhu langus.

Juhul, kui peale uuringut tunnete pearinglust, nõrkust või kõhuvalu, siis pöörduge koheselt valveõe või raviarsti poole.