

## MARUTAUD

Raabies, ehk marutõbi, on tavaliselt loomadel esinev haigus, inimesed haigestuvad harva. Tüüpilised viiruse levitajad on rebane, koer, kass, kährikkoer, nahkhiir. Haigus esineb suuremal osal maakeral. Inimene haigestub peale kontakti haige looma süljega, näiteks hammustusega. Profülaktiline vaksineerimine soovitatav isikutele, kes on tihedas kontaktis loomadega, näiteks loomaarstid,loomade hooldajad, põllumajanduse töötajad.

### Kokkupuutejärgne vaksineerimine

Pärast hammustust on oluline kohene haavatöötlus. Esmajärjekorras soovitatakse loputada ja pesta haava seebiga, seejärel puhastada 70° alkoholi või jooditinktuuriga. Ravi-vaksineerimine tuleb läbi viia arstliku järelevalve all.

Vaksineerimine toimub vaktsiiniga VERORAB. Verorab on inaktiveeritud vaktsiin marutõve vältimiseks kõrge riskiga isikutel ja pärast kokkupuudet marutõve viirusega.

### Eelnevalt mitte-immuniseeritud isikute vaksineerimine:

Lastele ja täiskasvanutele on annustamine sarnane: 5 süsti 0,5 ml annustena 0.,3.,7.,14. ja 28.päeval. Suure marutõveohu korral on vajalik esimesel päeval läbi viia ka samaaegne passiivne immuniseerimine, kasutades marutõvevastast inimese immunoglobuliini või marutõvevastast hobuse seerumit.

Eelnev vaksioonistaatus	Tegevuskäik
Vaksineeritud viimase 5 a jooksul	2 süsti: 0, ja 3. päeval
Vaksineeritud rohkem, kui 5a tagasi	5 süsti:0.,3.,7.,14. Ja 28. päeval koos immunoglobuliiniga, kui vajalik

Praktikas loetakse patsient mittetäielikult vaksineerituks, kui viimane vaktsiiniannus on manustatud üle 5 aasta tagasi või vaksineerimiskeemi ei ole täielikult järgitud.

### Mida on vaja teada enne VERORABI kasutamist

- Kokkupuute-eelne vaksineerimine tuleb edasi lükata palaviku ja ägeda haigestumise korral
- Teadaolev ülitundlikkus vaktsiini mõne komponendi suhtes
- Kõikidel juhtudel kaaluda riski ja kasu suhet
- Kokkupuutejärgne vaksineerimine:marutõbi lõpeb surmaga, seega ravi eesmärgil vaksineerimisele vastunäidustusi ei ole

### Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka VERORAB põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

- Kerged paiksed ärritusnähud: valu, punetus, turse, sügelusinduratsioon süstekohal  
üldnähud:mõõdukas palavik, külmavärinad, lihasvalu, seedetrakti häired (iiveldus, kõhuvalu)
- üksikjuhtudel on esinenud anafülaksiat, nõgestõbe ja löövet
- kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, palun rääkige sellest oma arstile.

NB! Kui selgub, et teid rünnanud või hammustanud koer on vaksineeritud, siis võib katkestada vatsineerimise kuuri.

*Algallikas: VERORABI infoleht*

*Juhendi koostas: Anneli Peredirjeva*