

LAPSEVANEMA VÕI HOOLDAJA ANESTEESIAST TEAVITAMISE JA NÕUSOLEKU VORM

Nimi

Isikukood

Haigusloo number

Lugupeetud lapsevanem!

Valu äravõtmiseks operatsiooni või valuliku uuringu ajal kasutatakse narkoosi (üldtuimastust) ja/või regionaaltuimastust. Tuimastust viib läbi anestezioloog e narkoosiarst. Enne operatsiooni antakse Teie lapsele vajadusel rahusteid. Lapse veresoonde pannakse plastmassist kanüül, mille kaudu saab manustada vajalikke narkoosiaineid ja ravimeid.

Narkoos e üldtuimastus lülitab välja teadvuse ja valutundlikkuse kogu kehas. Narkoosi ajal viibib Teie laps rahulikus unetaolises seisundis. Lühiaegse operatsiooni teostamiseks pannakse Teie lapse näole hapnikumask ning veenikanüüli süstitakse narkoosiaineid (**veenisisene narkoos**). Pikemad operatsioonid teostatakse masknarkoosis. **Masknarkoosi** puhul hingab Teie laps nina ja suu peale asetatud maski kaudu hapniku ja gaasiliste narkoosiainete segu. **Intubatsioonnarkoosi** puhul pannakse peale uinumist ja lihaste lõõgastamist Teie lapse hingamisteedesse toru, mille kaudu viiakse hapnik ja narkoosiained otse kopsudesse. Intubatsioonitoru tagab vajaliku hingamise ja ühtlasi väldib maosisu sattumist hingamisteedesse oksendamise korral.

Operatsioonijärgseks valutustamiseks kasutatakse teatud operatsioonide puhul sakraal- või epiduraaltuimastust. **Epiduraaltuimastuse** korral jäetakse seljaaju närvijuurte juurde peenike toru, mis kleebitakse plaastri abil seljale.

Igal tuimastusmeetodil on omad eelised. Sõltuvalt Teie lapse organismi omapärast ja operatsiooni kulust võivad ilmneda ka mõned puudused. Teie lapel võib esineda allergia (ülitundlikkus) tuimastuseks kasutatud ainete või vahendite (nt plaaster, puhastusvahendid) suhtes. Peale narkoosi võib Teie laps kogeda halba enesetunnet, uimasust, neelamise valulikkust, hääle kähedust, iiveldust lihaste valulikkust.

Kogu operatsiooni ajal tegeleb Teie lapsega narkoosiarst, keda abistab narkoosiõde. Kaasaegsete aparatuuride abil jälgitakse ja säilitatakse Teie lapse elutähtsad funktsioonid - hingamine, vereringe, kehatemperatuur. Operatsioonijärgselt taastub Teie laps tuimastusest ärkamisruumis. Sõltuvalt operatsiooni raskusastmest võib olla vajalik operatsioonijärgne ravi intensivravi osakonnas. Narkoosi- ja tuimastuse labiviimiseks kasutatakse meie haiglas kaasaegseid ravimeid, millel on vähe kõrvaltoimeid. Ometi peaksite teadma, et iga operatsioon on seotud riskiga. Riski suuruse hindamiseks ja riski vähendamiseks on väga oluline teiepoolne koostöö narkoosiarstiga. Te peaksite andma võimalikult täpset teavet oma lapse kaasnevate haiguste, üldseisundi, eluviiside, kasutatud ja praegu kasutatavate ravimite ning ülitundlikkuse esinemise kohta. On äärmiselt oluline, et Te täpselt järgiksite narkoosiarsti ettekirjutusi.

Teie lapse turvalisuse tagamiseks narkoosi ajal ja sellele järgneval perioodil on Teil vaja täita järgnevaid juhiseid:

- **Teie laps ei tohi 6 tundi enne planeeritavat operatsiooni süüa ja 3 tundi juua** ega närida närimiskummi. Toit võib narkoosi ajal sattuda hingamisteedesse ja põhjustada lämbumise.
- Te peate vibima lapse läheduses **24 tunni jooksul** pärast päevakirurgilist operatsiooni.

Narkoosiarst vestleb Teiega operatsiooni eel, temaga koos saate valida Teie jaoks kõige sobilikuma tuimastusmeetodi ja temalt saate täpsemad vastused tekkinud küsimustele. Et valida sobivaim tuimastusmeetod, vajame võimalikult täpseid ja põhjalikke andmeid Teie lapse tervisliku seisundi kohta. Selleks palume Teil täita juuresolev küsitlusleht. Narkoosiarstiga vestlemise järgselt palume Teil oma allkirjaga küsitluslehel kinnitada nõusolekut anesteesia läbiviimise kohta.

Narkoosieelne küsitlusleht

Kui vajate abi vastamisel, palume pöörduda arsti või õe poole!

Lapse vanus: _____ a ja kehakaal: _____ kg.

- | | | | |
|-----|--|----|-----|
| 1. | Kas Teie laps on olnud haige viimase 12 kuu jooksul _____ | ei | jah |
| 2. | Kas Teie laps on olnud varem haiglaravil? _____ | ei | jah |
| | Millal? Miks? _____ | | |
| 3. | Kas Teie laps saab praegu mingeid ravimeid? _____ | ei | jah |
| | Milliseid? _____ | | |
| 4. | Kas Teie last on varem opereeritud? _____ | ei | jah |
| | Mida? Millal? _____ | | |
| 5. | Kas Teie laps on varem saanud narkoosi? _____ | ei | jah |
| | Millal? _____ | | |
| 6. | Kas narkoosi ajal või peale seda ilmnes midagi erilist? _____ | ei | jah |
| | Mida? _____ | | |
| 7. | Kas lapse veresugulastel on seoses operatsiooni ja narkoosiga olnud raskeid tüsistusi? _____ | ei | jah |
| | Mida? Millal? _____ | | |
| 8. | Kas Teie lapsel on olnud ülitundlikkust (allergiat) ravimitele? _____ | ei | jah |
| | toiduainetele? _____ | ei | jah |
| | muudele ainetele? _____ | ei | jah |
| | Millele? _____ | | |
| | Milles see väljendus? _____ | | |
| 9. | Kas Teie lapsele on varem tehtud vereülekannet? _____ | | |
| | Millega seoses? _____ | | |
| | Kas on olnud erilisi reaktsioone vereülekandele? _____ | ei | jah |
| 10. | Kas Teie lapsel on esinenud pikenenud veritsust (kergelt tekivad sinised plekid, ninaverejooksud)? _____ | ei | jah |
| 11. | Palun vastake, kas Teie laps on põdenud või põeb loetletud haigusi: | | |
| | hingamisteede haigusi? _____ | ei | jah |
| | südamehaigusi? _____ | ei | jah |
| | Kas Teie lapel on diagnoositud südameriket? _____ | ei | jah |
| | lihasnõrkust või lihashaigusi? _____ | ei | jah |
| | närvisüsteemi haigusi? _____ | ei | jah |
| | suhkurtõbe? _____ | ei | jah |

Jaatava vastuse puhul kirjutage, mis haigus, millal on põdenud ja kui teate, siis, mis ravi on saanud või mida saab praegu? _____

12. Mida Te veel peate vajalikuks teatada meile oma lapsest? _____

13. Soovin vastuseid järgmistele küsimustele _____

Lapsevanemat informeeris: _____ Kuupäev: _____ Allkiri: _____

Olen aru saanud narkoosiarsti poolt selgitatud tuimastuse olemusest. Olen teadlik narkoosi riskiteguritest ja võimalikest tüsistustest. Nõustun arsti pool valitud tuimastusmeetodiga.

Kuupäev: _____ Lapsevanema (või hooldaja) nimi _____

Lapsevanema (või hooldaja) allkiri _____